



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius griseocarneus Carteret

En milieu humide, sous aulnes. Chapeau 15-25 mm, campanulé puis étalé avec un mamelon aigu, très fibrilleux, brun châtain à brun noirâtre au centre, fortement hygrophane par la marge et pâlisant en gris rosâtre. Lames peu serrées, gris lilacin au départ puis ocre rouille, arête blanche. Stipe subconcolore au chapeau plus ou moins couvert de restes de voile blanc. Chair brun rougeâtre violacé, noirâtre à la base du stipe. Odeur sans particularité. Spores 9-12,5 x 5,5-6,5 µm, ellipsoïdes, finement verruqueuses.

Egalement sous aulnes, avec des spores plus petites, à comparer avec *C. alnetorum* (véritable sosie dépourvu de tons rosé lilacin) et dans une moindre mesure avec *C. helvelloides* (chapeau plus jaune-brun olivâtre).

Notre récolte a été réalisée en août 2015 dans le secteur de Brigueuil, les spores observées mesuraient 9-12,5 x 5,5-6 µm. Elle semble posséder les caractères de la Section *Fraterni* Sous-section *Fraterni* où se situe ce taxon ; ensuite l'écologie et la taille des spores (les plus grandes de cette Sous-section) limitent drastiquement le choix d'espèces possibles.

Biblio : ADC Bidaud & al.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD