



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius inhonestus (Weinm.) Moëgne-Loec, & Reumaux

Sous saules. Chapeau 10-25 mm, mamelonné, hygrophane, brun châtain sombre avec le centre presque noir, puis orangé à brun beige roussâtre en séchant. Lames ochracées puis rouillées. Stipe brunâtre floconneux de grisâtre. Chair brune, plus sombre vers la base. Odeur iodée à herbacée. KOH brun-noir sur toutes les parties. Spores 7,5-9 x 5-6 µm, subglobuleuses, avec des verrues particulièrement saillantes.

A comparer avec :

- *C. ovoideosporus* : spores subtilement plus subglobuleuses avec des verrues plus discrètes ;
- *C. helobius* : spores elliptiques.

De nombreux cortinaires existent dans ce Sous-genre *Hydrocybe*, et distinguer les espèces avec certitude sans avoir recours à l'ADN est presque impossible. Ici, en plus de l'écologie et d'éléments macroscopiques concordants, le caractère singulier des spores avec cette ornementation qui frappe dès le premier coup d'œil sous le microscope, nous ont incité à adopter le binôme ici décrit. Notre récolte a été réalisée en avril 2018, sous saules sur la commune de Montendre.

Biblio : ADC Bidaud et al.