



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius subumbilicatus Rob. Henry

Sous feuillus. Chapeau 6-10 cm, visqueux, jaune verdâtre, jaune-beige à jaune ochracé, gris bleuté vers la marge, couvert de fibrilles innées. Lames lilacines au départ, vite argilacées puis rouillées, avec la marge blanchâtre. Stipe blanchâtre, violeté au sommet, base bulbeuse plus ou moins marginée. Chair blanche. KOH subnul sur cuticule et chair. Spores 11-15 x 6,5-8 µm, ellipsoïdes à subamygdaliformes.

A comparer avec :

- *C. viridocoeruleus* : chapeau brun châtain parfois un peu olivâtre ou violacé, lames bleu violacé avec l'arête concolore et le restant, spores amygdaliformes ;
- *C. violaceoserrulatus* : chapeau jaune ochracé à jaune, arête des lames bleu violacé et le restant, spores citriformes ;
- *C. arcifolius* : chapeau couvert de plaques de voile jaunâtre, bulbe avec des restes de voile violet, spores ellipsoïdes à subamygdaliformes ;
- *C. camptoros* : sous conifères surtout en montagne, chapeau hygrophane et mamelonné, spores amygdaliformes ;
- *C. montanus* : sous conifères, lames vert olive, KOH rouge-brun sur cuticule et chair.

Nous avons longtemps hésité pour adopter le binôme ici décrit, n'oublions donc pas les réserves d'usage bien sûr... Les quelques éléments discriminants sont notamment, la couleur de l'arête des lames non bleue, le haut du stipe violacé et les grandes spores non amygdaloïdes ; à noter néanmoins que la chair de nos exemplaires est un peu lilacine. Notre récolte a été réalisée en novembre 2011 dans les bois de feuillus de Juicq.

Biblio : Bull. SMF 67 (3) 1952 - ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD