



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius subannulatus Jul. Schäff. & M.M. Moser

Sous feuillus ou conifères. Chapeau velouté feutré, ocre olivacé, légèrement brunissant vers le centre. Lames ocre olivacé puis brunes. Stipe jaunâtre olivacé, voile vert-jaune, zone annulaire assez nette rouillée à maturité par les spores. Chair brun-vert foncé dans le chapeau, orangé olivâtre dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. KOH rouge purpurin sur la cuticule et la chair (mais identique pour les espèces du même groupe). Spores $6,5-7(7,5) \times 5-6(6,5) \mu\text{m}$. A comparer avec :

- *C. cotoneus* (et sa var. *mellinoides*), plus trapu, voile brun olivâtre en guirlandes sur le stipe et spores supérieures ;
- *C. leproleptopus* et *C. psittacinus* : très vivement colorés de jaune verdâtre ;

C'est l'automne, dans les bois de Leuzois à Soullignonne, que nous rencontrons ces cortinaires, ils nous semblent pouvoir être rattachés au taxon ici décrit.

Biblio : ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD

