



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius sulcatipes* R. Henry

Sous feuillus sur sol argilo-calcaire. Chapeau longtemps convexe, sec, peu hygrophane, finement vergeté de brun sur fond beige brunâtre à gris-brun, un peu plus brun rougeâtre au disque. Lames ocre rouillé. Stipe blanchâtre ochracé orné de fibrilles brunes, avec une fine zone annulaire au sommet et la base légèrement clavée. Chair beige brunâtre. Odeur herbacée à caoutchoutée, saveur douce. KOH gris-brun sur cuticule, acajou puis brun terne sur chair. Spores 8-9,5 x 5,5-6,5  $\mu\text{m}$ .

Ce taxon semble trouver sa place dans la Section *Sericeocybe*, et probablement dans Ss.-section *Strenuipedes* qui regroupe des espèces ayant tendance au noircissement, bien que celui-ci ne soit que légèrement brunissant.

Nous pensons raisonnablement pouvoir nommer notre récolte du binôme peu connu décrit ici, nom qui nous a été suggéré par M. Guillaume Eyssartier. Elle a été réalisée en octobre 2015, sous chênes, charmes et châtaigniers dans les bois de Louzac St André (16).

Biblio : bull. SMF 99 fasc. 1, p. 90 (1983) - Journal des J.E.C. (journées européennes des cortinaires) n° 10 (2008) p. 57-61.

*Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD*