



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius tabularis* (Fr. :Fr.)Fr.

Sous feuillus, souvent sous bouleaux. Chapeau brun argilacé, brun-jaune ochracé à jaune grisâtre, parfois fortement ridé. Lames beiges à bleu-gris puis ochracées. Stipe blanc à bleuté au sommet, puis ochracé, voile peu copieux, base un peu dilatée. Chair blanchâtre. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-9 x 5,5-7  $\mu\text{m}$ , typiquement un peu moins globuleuses que chez les espèces de la même Ss.-section *Anomali*.

A noter l'existence de *C. rugosus*, binôme qui, à l'occasion de cette récolte, aurait pu avoir notre préférence au vu des chapeaux radialement ruguleux, voire cannelés ; mais ce caractère semble être sans valeur spécifique, d'ailleurs *C. rugosus* ne serait qu'un synonyme de *C. anomalus* selon des études biomoléculaires récentes.

Notre récolte a été réalisée en octobre 2015, parmi les sphaignes sous bouleaux et saules dans les bois de Massignac (16), les spores observées mesuraient 6,5-8 x 5,5-6,5  $\mu\text{m}$ . Nous remercions vivement les collègues qui nous ont apporté leur vision scientifique de ces espèces, nous permettant ainsi de trancher et de baptiser ces cortinaires probablement peu communs dans notre région.

Biblio : ADC Bidaud et al. Flora photographica.