



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

## *Cortinarius diffractosuavis* Chevassut & R. Henry

Sous chênes sur sol calcaire, surtout sous chênes verts. Chapeau ocre beige sale voilé de grisâtre argenté, marge légèrement méchuleuse à squamuleuse. Lames brun-roux puis rouillées. Stipe fibrilleux, couvert de voile blanc, se tachant de brun au toucher. Chair blanchâtre ochracé. Odeur agréable et puissante de frangipane ou d'alcool de poire, saveur douce. Spores 10-12,5 x 7-8  $\mu\text{m}$ .

A comparer surtout avec *C. hillieri*, à odeur faible ou nulle et spores plus petites.

Ce cortinaire, surtout méditerranéen, n'est peut-être pas fréquent dans notre région, nous pensons l'avoir trouvé en novembre 2014 avec la récolte présentée ici, réalisée sous chênes verts dans les bois du Douhet. L'odeur puissante d'alcool de poire, rappelant typiquement celle d'*Inocybe bongardii*, nous a interpellé, les dimensions sporales (10-11,5 x 7-7,5  $\mu\text{m}$ ) nous semblent confirmer ce taxon.

Biblio : ADC Bidaud et al.

*Fiche réalisée en septembre 2016 par Patrice TANCHAUD*