



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius omissus Bidaud

Synonyme : *C. omissus*

Nom français : Cortinaire semi-sanguin

Sous feuillus. Chapeau hygrophane, rouge pourpre, rouge-brun, brun orangé à rouge cuivré ou brun olivacé (teintes très variables selon les aspects cités ci-dessous). Lames rouge sang à rouge orangé. Stipe jaune olive à jaune citrin pâle parcouru d'un voile fibrilleux brun-rougeâtre à brun gris olivâtre formant des bracelets ou des chevrons (sous son aspect *omissus*), mais parfois seulement fibrilleux et coloré d'orangé rougeâtre à la base (aspect *ornatipes*). Chair brun-rougeâtre dans le chapeau puis ochracée, crème ocre dans le stipe. Odeur de rave ou d'iode. KOH pourpre noir sur cuticule, stipe, lames et chair. Spores 5,5-8,5 x 4-5 µm (fourchette variable selon les récoltes).

A comparer avec *C. semisanguineus* : surtout sous pins, voile absent ou peu évident sur le stipe.

Nous avons récolté ce cortinaire en septembre 2017, sous majorité chênes verts en forêt de La Coubre, les spores observées étaient petites, mesurant 6-7 x 3,8-4 µm. Sa présence et sa fréquence seront à vérifier à l'avenir, car il a probablement souvent été confondu avec *C. semisanguineus* par le passé.

Biblio : ADC Bidaud et al.