



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Tricholoma fulvum (DC. : Fr.) Saccardo

Synonyme : *T. flavobrunneum*

Nom français : Tricholome fauve

Sous bouleaux et peupliers. Chapeau visqueux, brun-fauve, marge cannelée. Lames jaune vif puis jaunâtre ochracé taché de rouille. Stipe couvert de fibrilles brun roussâtre sur fond jaunâtre. Chair jaune. Odeur farineuse. Spores 6-8 x 4,5-6 µm.

T. pseudonictitans se distinguerait par sa poussée sous conifères, la marge du chapeau non cannelée, des lames crème, la chair crème un peu jaune vers la périphérie et ne sentant pas la farine. Ces caractères tranchés ne sont pas évidents et nombreuses sont les récoltes aux caractères croisés. Il est donc fort possible que ces deux taxons ne soient que des synonymes, comme déjà signalé dans certains ouvrages ou articles. Les études phylogénétiques à venir seront à surveiller.

Ce tricholome est fréquent chaque automne, plutôt sous bouleaux où il pousse en grand nombre. A noter page 2, photographie du haut, une récolte sous épicéas qui justement pourrait faire débat ...

Biblio : littérature courante.

