Ordre : *Cortinariales* Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius praestans (Cordier) Gillet

Nom français : Cortinaire remarquable

Sous feuillus, sur sol calcaire. Chapeau charnu, brun pourpré, brun bleuté à brun-rouge, typiquement ridé, souvent avec des plaques de voile au centre et vers la marge. Lames blanchâtre lilacin puis brun rouillé. Stipe blanchâtre à violet, guirlandé d'un voile subconcolore. Chair blanche, odeur et saveur sans particularité. Spores 14-17 x 8-10 µm.
Espèce bien caractérisée, à comparer néanmoins avec d'autres plus ou moins ressemblantes, toutes à spores plus petites, cf. la fiche de *C. balteatocumatilis*.
A noter l'existence de *C. blattoi* syn. *C. lapponicus*, sosie poussant sous épicéas en montagne et dans le nord de l'Europe.

Ce cortinaire porte bien son nom, il n'est pas fréquent dans la région, mais il peut se rencontrer néanmoins l'automne dans différents secteurs, comme nous l'avons constaté en Charente-Maritime et Charente.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.

Fiche réalisée en décembre 2024 par Patrice TANCHAUD