



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius joguetii Melot

Synonyme : *C. odoratus* ?

Nom français : Cortinaire de Joguet

Description : Chapeau peu charnu de 5 à 8 cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe à marge mince, enroulée et parfois flexueuse ; cuticule visqueuse puis sèche, fibrilleuse vers la marge, à disque parfois squamuleux ; couleur vert olive plus clair vers la marge et à disque résolu en squamules roussâtres, réaction rouge à la potasse ; stipe assez court, fibrilleux, jaune citrin verdoyant, à bulbe peu marginé et jaune soufre à la base (mycélium) ; lames moyennement serrées, d'abord jaune vert olivâtre rapidement rouillées ; chair blanchâtre, jaune citrin sous la cuticule, au cortex et à la base du stipe, violetée dans la moelle, à forte odeur de fleur d'oranger ; réaction subnulle à la potasse (rosâtre sale) ; spores 9,5-11 x 5,5-6 µm.

Récoltes : en 2011 sous chênes verts et chênes pubescents sur sol calcaire à « Torfou » Saint-Porchaire (17).

Remarques : ce cortinaire est caractérisé par son chapeau vert olive et sa forte odeur de fleur d'oranger ; par la couleur, il pourrait être confondu avec *C. olivascentium* (= *C. xanthochlorus* ?) qui présente un chapeau rapidement envahi de fibrilles rougeâtres, une chair jaune dans le stipe, un bulbe tapissé de mycélium mauve et exhale une odeur de pâtisserie.

Biblio : *C. joguetii* Melot, 1989, Doc Mycol, XX (77), p 95.

Fiche réalisée en mars 2012 par Patrick BOISSELET