



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## ***Cortinarius nymphaecolor*** Reumaux

Synonymes : *C. molochinus* ; *C. rickenianus*

Nom français : Cortinaire à couleur de nymphe

Description : chapeau de 4 à 8 (10) cm de diamètre, d'abord convexe à convexe-plan à marge enroulée et ondulée. Cuticule légèrement amère, visqueuse puis sèche, lisse, présentant un voile blanc membraneux en son centre ; couleur délicatement rose mauve lilacin (parfois blanchâtre sur les sujets sous exposés à la lumière), rapidement envahie de flammèches ocre-fauve puis entièrement roussâtre ; réaction encre rouge à la potasse ; stipe relativement court à bulbe marginé, voire subvolvacé, à couleur blanchâtre teinté de violeté puis rapidement roussâtre ; réaction encre rouge sur le rebord du bulbe ; lames serrées, d'un magnifique mauve vif puis rouillées ; chair violetée au cortex du stipe, blanchâtre ailleurs, à réaction subnulle à la potasse (rose sale) ; spores 8-10 x 5-6  $\mu\text{m}$ .

Récoltes : en 2009 et 2011 sous chênes verts en milieu sablonneux sur l'île d'Oléron (17).

Remarques : ce cortinaire est remarquable par sa couleur lilacine rapidement décolorante, ses lames d'un magnifique violet et par sa réaction encre rouge instantanée aux bases fortes sur la cuticule et sur le rebord du bulbe. *C. rioussetorum*, qui présente également des tonalités lilacines évanescentes, ne présente pas ce type de réaction aux bases.

Biblio : atlas des cortinaires Pars VI Pl 122 Fiche 224

*Fiche réalisée en mars 2012 par Patrick BOISSELET*



