



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius quercilicis (Chevassut & Henry) R.Henry

Nom français : Cortinaire des chênes verts

Description : Chapeau très charnu de 5 à 10 (15) cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe à marge enroulée ; cuticule visqueuse puis sèche parfois ornée au disque ou à mi-rayon de verrues vélaires blanchâtres ou concolores ; couleur brun roux à brun fauve laissant entrevoir sur les exemplaires frais un fond jaune visible surtout vers la marge ; réaction acajou (brun rouge) à la potasse ; stipe élancé, fibrilleux, jaune pâle à jaune citrin, à bulbe marginé concolore parfois roussâtre au dessus et blanchâtre au-dessous (mycélium) ; lames assez serrées, jaune de chrome enfin rouillées ; chair jaune citrin pâle plus accusé au cortex et dans le bulbe, à odeur de brioche ; réaction rosâtre pâle à la potasse ; spores 10-13,5 x 6-7,5 µm.

Récoltes : en 2009 et 2011 sous chênes verts et chênes pubescents sur sol calcaire à Soulignonnes (17).

Remarques : ce cortinaire est caractérisé par son aspect élancé mais robuste, sa couleur brun roux à brun châtain sur fond jaune, sa chair jaune pâle et son odeur de pâtisserie ; les exemplaires photographiés correspondent en tous points aux récoltes effectuées sous *Quercus ilex* en région méditerranéenne (sud de l'Ardèche).

Biblio : 1988 ; Bull.Soc.Myc.France 104 (4): p 280