



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## ***Cortinarius cf. flavopallidus*** M.M. Moser

Nom français : Cortinaire jaune pâle

Description : Chapeau charnu de 5 à 7 (10) cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe-à marge enroulée puis relevée et sinueuse ; cuticule visqueuse, lisse, feutrée dans la prime jeunesse, à disque givré de plaques vélaires blanchâtres ; couleur jaune paille flammée à partir du disque de teintes fauvâtres ; réaction nulle à la potasse ; stipe assez court, fibrilleux jaune pâle puis roussissant, à bulbe marginé blanc en-dessous et orné de fibrilles jaunes au-dessus ; lames serrées, jaune-pâle à jaune de cire puis rouillées ; chair blanchâtre puis jaunissante en séchant, jaune citrin au cortex du stipe, à odeur raphanoïde ; réaction subnulle à la potasse (rosâtre sale) ; spores 11-13 x 7-8  $\mu\text{m}$ .

Récoltes : en 2010 et 2011 sous chênes verts et chênes pubescents sur sol calcaire à Pont l'Abbé d'Arnoult et Trizay (17).

Remarques : ce cortinaire est caractérisé par son chapeau de couleur jaune paille, sa chair blanchâtre et son odeur de rave ; il ressemble à *C. claroflavus* mais qui présente une teinte jaune dans le stipe et rosâtre dans le bulbe, à réaction rouge vif sur la cuticule aux bases.

Biblio : M.M Moser ; 1960 Die Gattung Phlegmacium, p. 359-360.