



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius catharinae* Consiglio

Synonymes : *C. pallens*, *C. pseudoparvus*

Sous chênes sur sol calcaire. Chapeau visqueux, jaune pâle à jaune ochracé plus ou moins panaché de crème blanchâtre, centre avec restes de voile blanchâtres. Lames lilacines puis ochracé rouillé. Stipe blanchâtre, lilacin au sommet ; gros bulbe aplati. Chair blanche, lilacine dans le cortex du stipe. KOH rouge sang à rose éosine (mais parfois plus terne) sur cuticule et bulbe, subnul sur chair. Spores 8,5-11 x 6-6,5 µm.

A comparer avec quelques espèces de cette même section *Calochroi* poussant également sous feuillus :

- *C. albertii* : KOH similaire, chapeau blanchâtre à blanc ochracé pâle, stipe blanchâtre et lames blanc grisâtre à peine violacées ;
- *C. nymphicolor* : KOH similaire, chapeau initialement blanchâtre rosé à lilas, puis ochracé jaune ;
- *C. platypus* : KOH brun grisâtre sur cuticule ;
- *C. sublilacinopes* : véritable sosie de *C. catharinae*, KOH orangé rosé à la marge du chapeau (parties plus claires) et brun au centre (plus roussâtre), orangé rougeâtre sur le bord du bulbe, rosâtre sur le bulbipellis.

Dans notre région, ce cortinaire est visible de fin octobre à fin novembre, il est assez fréquent dans les forêts de feuillus, surtout sous chênes verts, par exemple à Souligonne, Port d'Envaux, Le Douhet ...

Biblio : ADC Bidaud et al. - Bull. société mycologique de Strasbourg, n° 117 (2018).

*Fiche réalisée en février 2023 par Patrice TANCHAUD*



