



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius rheubarbarinus Henry

Nom français : Cortinaire à odeur de rhubarbe

Sous feuillus, plutôt sur sol calcaire. Chapeau plus ou moins bossu, parfois avec une ou deux inflexions circulaires concentriques, sec, hygrophane, brun ochracé puis rapidement ochracé grisâtre pâle par la marge, disque restant plus sombre. Lames argilacé ochracé puis brun-fauve. Stipe blanc grisâtre, argenté ou bleuâtre au sommet, brunissant à la manipulation par disparition du fibrillum qui le recouvre, base claviforme souvent fusoïde. Chair marbrée de brun grisâtre. Odeur forte et aromatique, de persil, de noix muscade ou de rhubarbe. Saveur douce. KOH subnul sur cuticule. Spores 7,5-10 x 5-6 μm .

C. phaeosmus est un taxon proche qui semble difficile à distinguer, il est même synonymisé par certains auteurs.

Malgré cet unique exemplaire, nous pensons raisonnablement pouvoir présenter ce cortinaire peu fréquent dans la région, nous l'avons récolté en octobre 2014, en milieu mêlé avec présence de chênes, en forêt d'Essouverts commune de Lozay. Son aspect peut paraître banal, mais son odeur singulière, en l'occurrence de persil, nous a aisément permis de le reconnaître, les spores contrôlées mesuraient 7,5-9,5 x 4,5-5,5 μm .

Biblio : ADC Bidaud et al.