



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius trivialis Lange

Synonyme : *C. collinitus* ss. auct.

Nom français : Cortinaire trivial

Surtout sous saules, écologie restant néanmoins à définir. Chapeau visqueux, brun-rouge, brun ochracé à olivacé. Lames brunes ou violettes, puis rouillées. Stipe couvert de bourrelets visqueux (pouvant être parfois absents, cf. photographie ci-dessus à droite), blanchâtre au sommet, brun en dessous. Chair blanchâtre, brune dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. Spores 10-13 x 6-7 μm .

Il semble évident aujourd'hui que *C. trivialis* forme un complexe d'espèces restant à débrouiller, toutes plus ou moins liées à une essence. *C. rickenii* par exemple (avec des lames violettes) pousserait sous chênes, binôme qui pourrait donc s'adapter à quelques récoltes présentées ici.

L'automne, il est fréquent de rencontrer de tels cortinaires, mais dans l'immédiat, et dans l'attente d'études à venir, il nous paraît raisonnable de rester sur le binôme ici décrit, sensu lato donc...

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR - Champignons d'Europe tempérée Læssøe & Petersen.



