



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

## *Limacella illinita* (Fr. : Fr.) Murrill

A noter que le nouveau nom à adopter, suite à une publication de 2019, est *Zhuliangomyces illinitus*.

Nom français : Limacelle baveuse

En forêt. Chapeau fortement glutineux, blanchâtre à crème rosâtre, sommet légèrement ochracé. Lames blanchâtres. Stipe très visqueux, blanc crème, avec une zone annulaire formant un petit bourrelet assez fugace. Odeur farineuse. Spores 4,5-5 x 4-4,5 µm.

A comparer par exemple avec :

- *Zhuliangomyces marchettii*, cf. publication RMR 2024 (2) : véritable sosie sans réelles différences microscopiques, recours obligatoire à l'ADN ;
- *L. ochraceorosea* : sous *Cupressus*, chapeau ochracé rosâtre, bien difficile à distinguer également (validité de ce taxon à vérifier à l'avenir)...
- *L. furnacea* : chapeau simplement lubrifié.

Espèce peu fréquente que nous ne rencontrons que très occasionnellement sur le littoral. A noter que suite à la description récente de *Z. marchettii*, de nouvelles observations seront indispensables à l'avenir, avec recours au séquençage, afin de savoir quelle espèce est réellement présente dans la région.

Biblio : littérature courante - RMR 2024 (2).





