



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius pseudomalachus Reumaux

Sous feuillus. Chapeau 5-8 cm, sec, argenté ochracé puis gris-brunâtre, couvert de fibrilles apprimées surtout de la marge jusqu'à mi-rayon. Lames argilacées, parfois lilacines vers la marge. Stipe blanchâtre ochracé, lilacin au sommet, base bulbeuse. Chair blanchâtre ochracé dans le chapeau et le bulbe, bleuté lilacin dans le stipe. Odeur de rave, saveur douce. Spores 7-9 x 4,5-5 µm.

A comparer avec :

- *C. pseudophlegmus* : ingrat à distinguer, spores similaires, surtout sous chênes, chapeau remarquablement hygrophane, sans odeur particulière ;
- *C. malachus* : sous conifères, surtout sous épicéas, stipe moins bulbeux marginé, spores plus grandes.

Ce cortinaire est à rechercher, semble-t-il, plutôt sur sol peu calcaire, c'est dans ces conditions que nous l'avons récolté à Brigueuil, sous feuillus avec majorité chênes, bouleaux, hêtres et châtaigniers.

Biblio : ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en janvier 2021 par Patrice TANCHAUD