



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke

Nom français : Pied-bleu

En forêt. Chapeau charnu, Violet, lilacin à brun violacé, pâlissant et brunissant avec l'âge. Lames violette à lilas. Stipe concolore au chapeau, fibrilleux et pruveux. Spores 7,5-9 x 4-5 µm.

A comparer avec quelques espèces du même genre (sporée blanche) :

- *L. sordida* : sosie plus petit et peu charnu, très fréquent et pousse à toutes saisons dans les haies, sous conifères, sur les bords de chemins, etc. ;
- *L. glaucocana* : ne se distingue que par ses teintes plus pâles (cf. peut-être page 2 ?), certains auteurs n'en font d'ailleurs qu'une variété ;
- *L. saeva* : en milieux herbeux, pied violet ; - *L. irina* : dépourvu de teintes lilacines, chapeau beige ochracé, odeur forte d'iris ou de fleur d'oranger.

A noter également une grosse ressemblance avec deux cortinaires, *C. lepistoides* et *C. purpurascens* (sporée rouille).

Cette espèce annonce souvent la fin de saison car elle arrive avec les premiers froids. Nous la rencontrons généralement en novembre et décembre, parfois dès le mois d'octobre et si les conditions le permettent jusqu'en janvier.

Biblio : littérature courante.



