



île de Ré, nov. 2011, leg. Jean Robert



île de Ré, nov. 2014

Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Leucoagaricus babosiae Bon

Sous feuillus ou conifères. Chapeau 2-4 cm, rosâtre à purpurin ou lilacin. Lames pâles, brunissantes. Stipe guirlandé de fibrilles brun purpurin sur fond blanchâtre, anneau fugace. Cuticule verdissant sous l'effet de l'ammoniaque, rosissant/rougissant au frottement puis brunissant, tout comme le stipe. Spores 7-8 x 4-5 μm , cheilocystides clavées avec un col plus ou moins étranglé ou capité.

A comparer avec :

- *L. badhamii* : plus grand, chapeau brun, plus rougissant et noircissant ;
- *L. jubilai* : morphologiquement proche, jaunit fugacement avant de rougir, puis noircit, stipe blanc, cheilocystides sans col ;

Rare espèce que nous avons eu le plaisir de rencontrer en différents points de l'île de Ré. Nous remercions M. Jacques Guinberteau pour l'aide apportée à l'identification de nos récoltes, et pour toutes les informations qu'il a bien voulu nous communiquer.

Biblio : DM HS n° 3 p. 103 - RDM 2004-1 (75-79).

