



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

## ***Leucoagaricus litoralis*** (Men.) Bon & Boiffard

Dans les dunes du littoral, boisées ou non. Espèce charnue. Chapeau ocre rosâtre pâle, rose chair à rose briqueté, avec présence fréquente de restes de voile au disque. Lames blanches. Stipe blanc à crème ochracé, base plus ou moins clavée. Réaction nulle à l'ammoniaque. Spores 8-10 x 4-5,5 µm.

A comparer avec deux taxons bien délicats à séparer :

- *L. wichanskyi* : chapeau plus vivement coloré, très rimeux, avec souvent une plaque de voile au disque ;
- *L. sublitoralis* : plus élancé, venant sous feuillus à l'intérieur des terres.

Sur le littoral, penser à comparer :

- *L. purpureoilacinus* : NH<sub>3</sub> nul, chapeau discolore (mamelon cerné de sombre avec le centre décolorant) et radialement diffracté dès qu'il s'épanouit ;
- *L. gaillardii* : NH<sub>3</sub> positif, chapeau rosé, rufescent au disque.

Cette espèce est très fréquente, elle est visible chaque année sur notre littoral, l'automne et en début d'hiver, dans l'arrière-dune, en forêts mêlées et sous *Cupressus*.

Biblio : DM HS n° 3 p. 98 - GEPR - Champignons des dunes J. Guinberteau.









