



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

## *Leucoagaricus georginae* (W. G. Smith) Candusso

En forêt, dans les taillis. Petite espèce fragile, cassante. Chapeau 1-1,5 cm, blanchâtre beige à saumoné, très rufescent brunissant au niveau des fibrilles donnant alors un aspect moucheté à vergeté. Lames rosissantes puis brunissantes. Stipe subconcolore au chapeau. Toutes les parties présentent des teintes rougeâtres qui s'intensifient typiquement et instantanément au toucher puis noircissent. Réaction verte à l'ammoniaque sur la cuticule. Spores 7-8 x 4-5 µm, cheilocystides à col pluriétrianglé.

Avec des cystides plus ou moins identiques, à comparer par exemple avec :

- *L. erubescens* : NH3 vert, petite taille également, rougissement faible, spores 6-7,5 x 3,5-4 µm ;
- *L. badhamii* : NH3 vert, plus gros à chapeau brun ;
- *L. croceovelutinus* : NH3 orange, taille légèrement supérieure.

Cette petite espèce est peu fréquente, nous l'avons rencontrée à quelques reprises, toujours l'automne dans les milieux sablonneux comme par exemple à Cadeuil et en forêt de la Coubre.

Biblio : littérature courante.

