



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Rhodocybe gemina var. mauretunica (Maire) Bon

Cette variété diffère du type par son aspect plus grêle, « clitocyboïde », et son chapeau ne dépassant pas 5 cm. Comme chez le type, le stipe peut être pourvu de rhizoïdes, son odeur est subnulle à farineuse et ses spores mesurent 5,5-7 x 4-5 µm.

Des récoltes avec de nets rhizoïdes (cf. ci-dessus à droite), pourraient être nommées *R. gemina f. subvermicularis*, mais la distinction entre ces variétés et formes semble bien délicate, cette forme étant d'ailleurs absente chez de nombreux auteurs.

A comparer malgré tout avec *Clitocybe vermicularis*, espèce printanière fort ressemblante, à sporée blanche (rose brunâtre chez les *Rhodocybe*) et spores plus petites.

Nous rattachons sous ce nom de *variété mauretunica* les récoltes de petits exemplaires difficiles à rapprocher du type, qui est d'aspect « tricholomoïde ».

Il est fort possible aussi que des récoltes pourraient présenter *R. asyae*, comme nous l'avons trouvé en octobre 2022 (cf. cette fiche avec exemplaires séquencés). Mais comment en être sûr sans recours à ADN ?

Biblio : DM 78 (1990) - Cetto n° 2716.

