



Fontcouverte, oct. 2011



Pointe espagnole, nov. 2011

Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Leucoagaricus melanotrichus (Malç. & Bert.) Trimbach

Nom français : Lépiote à poils noirs

En forêt, au sol ou sur bois pourrissant. Chapeau fibrilleux ou ponctué de gris-noir sur fond pâle, disque plus sombre. Lames blanches, jaunâtres à jaune citrin selon les récoltes et parfois même au sein d'un même peuplement. Stipe blanchâtre, anneau fragile. Spores 6-7,5 x 4-5 µm. Cuticule constituée de longs poils.

A comparer avec :

- *L. tener* : exsudant dans la jeunesse de fines gouttelettes ambrées qui laissent de petites taches brunes en séchant ;
- *Leucocoprinus griseofloccosus* : chapeau finement moucheté de gris lilacin, spores 5,5-6,5 x 3,3-3,8 µm, épicutis formé d'hyphes volumineuses et voile constitué de sphérocytes.

A noter l'existence de *L. melanotrichus* var. *fuligineobrunneus* (chapeau gris-brun pouvant rappeler *L. tener*) et var. *septentrionalis* (nordique).

Lépiote peu fréquente, nous l'avons malgré tout observée à plusieurs reprises sur le littoral et à l'intérieur des terres, l'été et l'automne, toujours sur bois pourrissant, de pin ou de feuillus (peuplier).

Biblio : littérature courante.





Saintes, nov. 2011