



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## ***Cortinarius quercilicis*** (Chevassut & R. Henry) R. Henry

Synonymes : *C. eufulmineus* ss. auct., *C. cereifolius* ss. auct.

Nom français : Cortinaire du chêne vert

Sous feuillus sur sol calcaire, plutôt sous chênes. Chapeau visqueux, jaune olivâtre rapidement châtain à brun cuivré par le centre, souvent avec des petits lambeaux de voile brun. Lames jaune soufre à jaune verdâtre puis ochracé rouillé. Stipe jaunâtre avec un bulbe marginé enveloppé d'un voile brun-jaune ; mycélium souvent jaunâtre. Chair blanchâtre, un peu jaunâtre dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. KOH subnul à brunâtre sur cuticule et chair. Spores 11-13 x 6,5-8 µm.

Voir la fiche de *C. fulminatus* pour quelques espèces proches, à comparer également avec :

- *C. xanthochlorus* : teintes olivâtres plus nettes, KOH brun-pourpre sur la cuticule, mycélium blanc ou violet ;
- *C. elegantior* : sous conifères, KOH rouge sur la chair du bulbe.

En présence de tels cortinaires, nous avons souvent hésité entre le binôme adopté ici et ceux que nous citons en synonymie repris de l'ouvrage *Funga nordica*. La majorité de nos récoltes a été réalisée l'automne, en présence de chênes verts à l'intérieur des terres, par exemple à Soulignonne et Pont l'Abbé d'Arnoult.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.- *Funga nordica* - GEPR.



