



Ordre : *Agaricales*

Famille : *Secotiaceae*

Lepiota oreadiformis Velen.

Synonymes : *L. laevigata*, *L. sublaevigata*

Synonymes possibles : *L. pratensis*, *L. rocabrunae*

Dans les prés et les clairières, également dans les dunes. Chapeau beige ochracé à orangé saumoné, vite craquelé et laissant apparaître le fond plus pâle, disque souvent plus sombre. Lames blanches puis carnées. Stipe guirlandé de bracelets orangés sur la partie inférieure. Spores 10-15 x 4,5-6 µm.

A comparer avec :

- *L. erminea* : chapeau lisse, blanc à crème ochracé pâle avec le centre souvent un peu plus sombre ;
- *L. ochraceodisca* (qui n'est peut-être qu'une forme colorée du précédent) : chapeau crème ochracé d'emblée et restant lisse (non craquelé), souvent dans les milieux dunaires.

La liste des synonymes en dit long sur la variabilité de cette lépiote qui semble assez fréquente chaque automne à l'intérieur des terres, particulièrement sur les pelouses calcaires. Des études sont toujours en cours afin d'y voir plus clair sur les réelles distinctions entre tous ces taxons.

Biblio : DM HS n° 3 - GEPR - Funga nordica - Pilzk. 3.









