



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Lyophyllaceae*

***Lyophyllum pseudosinuatum*** Consiglio, Contu & Saar

En forêt sur sol calcaire. Chapeau 5-12 cm, charnu, blanchâtre grisâtre à grisâtre brunâtre, fibrilleux et pruineux, pouvant rappeler *Entoloma sinuatum*. Lames blanchâtre crème, devenant gris-bleu à la manipulation puis noircissantes. Stipe blanchâtre, fibrillo-floconneux de grisâtre, souvent bulbeux. Odeur et saveur farineuses. Spores 6-8(9) x 5-7,5(8,5) µm, subglobuleuses à largement elliptiques. A comparer avec son sosie *L. rhopalopodium* (stipe également bulbeux), qui a des spores subtriangulaires à losangiques (7-9 x 5-7 µm). Attention, *L. transforme* (syn. *L. trigonosporum*) est une autre espèce (plus élancée) à spores triangulaires (8-11 x 7-8,5 µm).

Ce lyophylle a été récemment décrit (2004), il est probablement peu fréquent, nous l'avons observé l'automne à plusieurs reprises en Charente-Maritime.

Biblio : Österr. Z. Pilzk. 13 : 119-123 (2004).

