



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

Inocybe hirtella Bresadola

Nom français : Inocybe à odeur d'amandes amères

Sous feuillus, dans les taillis. Chapeau 3-5 cm, plus ou moins fibrilleux, ocre jaune à fauve doré. Lames beiges, brunes à maturité. Stipe blanchâtre, beige pâle puis rosé par le haut. Odeur d'amandes amères ou de laurier cerise, aussi dite de « colle de bureau ». Spores 8-10 x 5-6 μm . Basides tétrasporiques. Présence de cystides métuloïdes sur les lames (à paroi ne dépassant pas 2 μm), et sur toute la longueur du stipe.

A comparer avec *I. amygdalospora*, taxon peu connu décrit en 2005, qui se distinguerait essentiellement par des basides bisporiques et la paroi des cystides plus épaisse (3 μm).

Cette espèce n'est pas très fréquente, nous l'avons récoltée sur différents secteurs (Saintes, Soulignonne, ...) à la période automnale, parfois l'été lorsque les conditions étaient favorables. A noter que l'odeur est parfois peu prononcée sur le frais, elle peut être plus perceptible quelques heures après la cueillette notamment en sortant les champignons d'une boîte.

Biblio : littérature courante - Inocybe J. Stangl - DM n° 105 p. 66.