



Ordre : Polyporales

Famille : Meruliaceae

Climacodon pulcherrimus (Berk. & Curt.) Nikolajeva


Généralement sur bois de feuillus. Espèce surtout tropicale, rare sur notre continent. Chapeau semi-circulaire, blanchâtre puis orangé ochracé, velu. Hyménium constitué d'aiguillons concolores. Chair fibreuse, tendre. KOH rose rougeâtre. Caractères microscopiques : spores 4,5-6 x 1,5-3 μm , cystides absentes, hyphes du pileipellis typiques avec cloisons comprenant 2 à 4 boucles.

Nous remercions notre collègue François Valade de nous avoir laissé cette récolte réalisée ensemble, en juillet 2012, en milieu frais, sur bois de feuillu mort non identifié, aux Fontenelles commune de La Chapelle des Pots. La seule fructification ne présentait alors aucun aiguillon, c'est en conservant les morceaux de bois à l'humidité que nous avons pu suivre l'évolution de différents basidiomes. La microscopie s'est avérée conforme à la littérature : basides tétrasporiques 15-20 x 4-5 μm , spores 4-5(6) x 2-2,5 μm non amyloïdes et non cyanophiles, hyphes du pileipellis à boucles multiples aux cloisons.

A noter page 4 une nouvelle récolte réalisée par notre ami Guy Mauget, en septembre 2015, sur la commune de Louzac St André (16).

Biblio : Bull. S.M. Béarn 73 (1981) et 104 (1998) - Bull. Charente Nature 214 (2004) récolte A. Delaporte.

Fiche réalisée en janvier 2016 par Patrice TANCHAUD



Ci-dessus :

Evolution des basidiomes sur plusieurs semaines en conservant les morceaux de bois à l'humidité. La fructification (photographie haut gauche) est tout d'abord subglobuleuse, blanchâtre, molle et hispide, pouvant rappeler *Postia ptychogaster* au stade imparfait, elle a évolué en prenant des couleurs orangé ochracé sans former de chapeau. Celle en-dessous a rapidement formé une console semi-pilée en prenant des teintes ochracées et a poursuivi sa croissance en s'éclaircissant (photographie haut droit).

Ci-contre, microscopie :

- A : extrémité d'un aiguillon
- B : basides tétrasporiques 15-20 x 4-5 μ m
- C : 1 à 4 boucles par cloison aux hyphes du pileipellis
- D : spores 4-5(6) x 2-2,5 μ m



Ci-dessus :

Jeune fructification.
Réaction au KOH

Ci-contre :

Sur un autre morceau de bois à l'humidité, évolution d'un basidiome qui devient orangé ochracé, il pâlit à nouveau (deux photographies du bas) lorsque nous humidifions suffisamment le morceau de bois et qu'il poursuit sa croissance.

*Louzac St André (16),
sept. 2015, Leg. Guy Mauget*

