



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma undatum (Fr.) Moser

Nom français : Entolome ondoyeux

En pelouse moussue, en forêt, parfois sur bois. Chapeau 1-3 cm, fibrillo-soyeux, gris à grisâtre brun, souvent creusé et zoné concentriquement. Lames grisâtres ou brunâtres puis rosâtres, décurrentes. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur farineuse à nulle. Spores 7,5-10 x 6-7 μm . Cystides absentes.

A comparer notamment avec :

- *E. lanicum* : chapeau non zoné, brun à brun rougeâtre, odeur farineuse, spores 7-9 x 5,5-7 μm ;
- *E. korhoneni* : chapeau tomento-squamuleux, lames adnées à peu décurrentes ;
- *E. cettoi* : plus gros et plus pâle, présence de cheilocystides et spores plus grandes.

Nous rencontrons ces entolomes tous les ans, l'été ou l'automne, sur bois ou au sol en forêt, l'odeur farineuse peut être présente ou absente. Certaines récoltes pourraient probablement se rapporter à *E. lanicum*, mais nous n'y voyons pas clair du tout entre ces deux espèces ; le chapeau zoné pour l'un et non zoné pour l'autre, et le peu de différences dans les dimensions sporales, semblent être des caractères bien sensibles pour séparer ces deux taxons.

Biblio : littérature courante - Entoloma M.E. Noordeloos - BK4 86.







