



cutic.



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma chloropolium (Fr.) Moser

En prairies ou sous-bois. Chapeau subsquamuleux, ocre à brun jaunâtre ou gris-brun, centre plus sombre, marge olivacée ou glauque. Lames blanchâtres puis rose pâle. Stipe subconcolore, plus ou moins glauque. Odeur et saveur nulles. Cystides absentes et spores 9-11 x 6,5-7,5 µm.

La variabilité de ce taxon peut surprendre (teintes de chapeau plus ou moins sombres et du stipe plus ou moins glauques), il est fort probable que se cachent derrière ce nom différentes espèces encore aujourd'hui inédites.

A comparer avec *E. exile* et *E. formosum*, espèces cystidiées.

La récolte présentée a été réalisée en novembre 2010 sur la commune de Ste Gemme, les spores mesuraient 10-12 x 7-7,5 µm et nous n'avons pas vu de cheilocystides. La microscopie étant celle du groupe d'*E. exile*, il semble donc difficile de nommer cette récolte différemment.

Biblio : *Entoloma* M.E. Noordeloos – Pilzk. band 2 E. Ludwig - Bull. FMBDS 185 (2007) G. Corriol.

Fiche réalisée en juin 2019 par Patrice TANCHAUD