



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

## ***Entoloma pseudocoelestinum*** Arnolds

En prairies ou en forêts. Chapeau brun violacé à violacé noirâtre, puis gris brunâtre violacé, strié. Lames blanchâtres puis rosâtres, arête concolore. Stipe bleu d'acier à bleu violacé gris. Spores 8-11 x 5,5-8,5 µm, cheilocystides absentes.

*E. atrocoeruleum* s'en différencie par son chapeau non strié dans la jeunesse. A comparer également avec les espèces à chapeau strié :

- *E. chalybeum* : présence de cheilocystides ;
- *E. caesiocinctum* : nettement pâlisant à arête des lames bleue ;
- *E. coelestinum* : petite espèce à chapeau non strié et à petites spores ;
- *E. lividocyanulum*, chapeau brun jaunâtre et stipe nettement bleu ;
- *E. poliopus* : chapeau brun sombre sans tons bleus ou violacés.

A noter que *E. asprellum* serait un synonyme de *E. pseudocoelestinum* selon des études récentes ;

Cette espèce n'est pas fréquente, nous la rencontrons occasionnellement de la fin du printemps à l'automne, par exemple dans le secteur de Cadeuil sur la commune de St Sornin.

Biblio : BK4 65 - Entoloma M.E. Noordeloos