



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma sericeum (Bull.) Quélet

Synonyme : *E. sericeum* f. *nolaniforme*

Nom français : Entolome soyeux

En pelouses et prairies. Chapeau hygrophane, brun rougeâtre à brun-gris, plus ou moins papillé, séchant par bandes radiales, marge striée. Lames brunâtre pâle puis rosâtres. Stipe subconcolore au chapeau couvert de fibrilles gris argenté. Odeur et saveur farineuses. Spores 7-10,5 x 6,5-8 µm, cystides absentes. Boucles hyméniales présentes contrairement à son sosie, *E. sericeoides*, qui est généralement printanier.

Ce groupe a été récemment réétudié et il n'est pas toujours aisé de s'en sortir ; parmi les espèces qui semblent exister dans la région, il faut distinguer celles :

- à chapeau nettement strié : *E. minutisporum*, *E. juncinum* ;
- à chapeau non ou peu strié : *E. conicosericeum*, *E. vindobonense*, *E. cinereo-opacum*.

Espèce assez fréquente dans son écologie de prédilection, visible un peu partout, surtout en fin d'automne et l'hiver.

Biblio : littérature courante - Entoloma M.E – Noordeloos - Fungi non delineati 66 (2013) - GEPR.

