



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Leccinum cyaneobasileucum var brunneogriseolum Lannoy & Estades (Lannoy & Estades)

Nom français : Bolet brun grisâtre

Sous bouleaux. Chapeau gras soyeux, brun châtain à brun grisâtre, parfois avec teintes olivâtres en période humide. Pores blanc crème à ochracé grisâtre. Stipe blanchâtre, finement méchuleux. Chair blanchâtre, rosâtre à la coupe dans le stipe mais pas dans le chapeau, souvent bleu-vert à la base du stipe. Spores 15-20 x 4-6,5 µm.

Des récoltes à chapeau pâle sont à comparer avec *L. cyaneobasileucum*, ou quelques espèces proches citées sur cette fiche.

Ce bolet est très fréquent sous son essence de prédilection dans les trois départements que nous fréquentons, surtout l'automne, mais parfois dès l'été lorsque les conditions météorologiques le permettent.

Biblio : Monographie *Leccinum* d'Europe G. Lannoy et A. Estades - H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos (2005) : A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species, *Persoonia* 18(4) - GEPR.

Fiche réalisée en septembre 2018 par Patrice TANCHAUD



