



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer

Synonyme : *Leccinum duriusculum* f. *robustum*

Nom français : Bolet des peupliers

Sous peupliers (*Populus alba* et *Populus tremula*). Chapeau brun grisâtre à café au lait roussâtre. Pores crème à grisâtre rosâtre. Stipe blanc crème, finement méchuleux, plus ou moins clavé et subradicant. Chair ferme, légèrement vert bleuté à la base du stipe, rosissante puis violacé grisâtre à la coupe. Spores 13-17 x 4,5-5,5 µm. A noter que des exemplaires pâles doivent être comparés à *L. percardidum* qui vient dans la même écologie.

Ce bolet est visible presque chaque année sur nos secteurs de prospection, sous les peupliers trembles, souvent l'automne mais parfois dès l'été lorsque la pluviométrie permet quelques poussées.

Biblio : littérature courante - Monographie *Leccinum* d'Europe G. Lannoy et A. Estades - H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos (2005) : A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species, *Persoonia* 18(4).

Fiche réalisée en septembre 2024 par Patrice TANCHAUD



