



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

## *Leccinum percandidum* Blum

Nom français : Bolet rude blanc

Sous bouleaux et peupliers trembles. Chapeau blanc à blanchâtre, souvent faiblement coloré de rosé fauvâtre, roussissant ou noircissant au toucher. Pores blanc grisâtre à blanc brunâtre se tachant de brun. Stipe subconcolore au chapeau, souvent teinté de vert-bleu à la base. Chair rosissante, puis grisâtre à noirâtre. Spores 12,5-19 x 4-6,5  $\mu\text{m}$ .

Nous remercions notre collègue Robert Lagarde de nous avoir conduit à St Preuil (16), sur une station où ces bolets sortent chaque automne. Leur relation avec les peupliers trembles, très majoritaires à cet endroit, ne fait aucun doute, et nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas le moindre bouleau. H.C. Den Bakker et M.E. Noordeloos indiquent que *L. percandidum* ne serait qu'une forme pâle de *L. versipelle*, qui est exclusif des bouleaux, et les mettent en synonymie. Ne serait-ce qu'en raison de cette écologie différente, il nous est difficile de suivre ces avis, nous conservons donc le binôme ici présenté. A noter que *L. roseotinctum*, toujours selon ces auteurs, est synonyme de *L. versipelle*.

Biblio Monographie *Leccinum* d'Europe G. Lannoy et A. Estades - H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos (2005) : A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species, *Persoonia* 18(4).

*Fiche réalisée en mai 2015 par Patrice TANCHAUD*



