



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Physalacriaceae*

## *Flammulina fennae* Bas

Sur bois, espèce gracile et non cespiteuse. Chapeau à centre ochracé et marge blanchâtre. Lames blanches. Stipe pâle au sommet et base brun sombre à rougeâtre, plus ou moins radicant. Spores (5)6-8(9) x (3)3,5-4,5(5)  $\mu\text{m}$  (selon les ouvrages). Peut être confondu avec *Flammulina velutipes*, espèce hivernale et cespiteuse, à chapeau plus vivement coloré et spores plus cylindriques.

La seule récolte en notre possession de cette rare espèce a été réalisée en octobre 2012, sur un tronc pourrissant de sureau à St Amant de Nouère (16). Les chapeaux atteignaient au plus 24 mm. Les spores contrôlées mesuraient 6-8 x 3,5-4,5  $\mu\text{m}$ . Nous nous sommes longuement interrogé pour savoir si nous n'étions pas en présence de *F. velutipes* var. *lactea*, mais cette variété possède un stipe plus pâle à base légèrement brunissante avec l'âge (alors que tous nos exemplaires possédaient un stipe nettement sombre) et des spores plus cylindriques (comme le type).

Biblio : Cetto n° 2766 - DM HS n° 5 - Pilzkompendium E. Ludwig band. 1

*Fiche réalisée en avril 2015 par Patrice TANCHAUD*