



Ordre : Entolomatales

Famille : Entolomataceae

## ***Entoloma kuehnerianum*** Noordel.

Synonymes : *Rhodophyllus mammosus* var. *sericeoides*, *E. hirtipes* var. *sericeoides*

En prairie. Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et enfin étalé, gris-brun foncé, pâissant en gris-brun, fibrilleux à ridulé. Lames grises puis rosé brunâtre. Stipe brun grisâtre argenté, strié. Odeur nette d'huitre ou d'huile de poisson. Spores 10-14 x 7-9 µm, arête stérile constituée de cheilocystides souvent un peu capitées.

Pour les espèces à odeur similaire, voir *E. hirtipes* et surtout *E. fuscohebes* dont la ressemblance est assez troublante... Et pour cause, M. M. Noordeloos, à l'occasion d'une discussion lancée sur le forum Mycologia Europaea en mars 2021, annonce que *M. kuehnerianum* serait maintenant une espèce fantôme. Reste donc à savoir si nous devons rattacher nos récoltes à l'un ou l'autre des entolomes cités ci-dessus, l'avenir nous éclairera peut-être...

Cet entolome est assez fréquent, mais à l'image de ceux possédant cette odeur caractéristique, une étude des récoltes à venir ne sera pas superflue pour tenter de mieux les cerner.

Biblio : Entoloma M.E. Noordeloos.

