



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Marasmiaceae*

## ***Gymnopus inodorus*** (Pat.) Antonin & Noordel.

Synonymes : *Micromphale rufocarneum*, *Collybia inodora*

Sur branches tombées, surtout de chênes. Chapeau roux brunâtre, beige rosâtre au sec, marge striée. Lames grisâtre ochracé à rosâtres. Stipe prumineux, brun sombre, sommet plus pâle. Inodore. Spores 7-10 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques tortueuses.

A comparer notamment avec :

- *G. dichrous* : chapeau mat et peu strié, stipe plus fortement pubescent, cheilocystides clavées à fusiformes ;
- *G. brassicolens* et *Marasmiellus foetidus* : tous deux à odeur de chou pourri.

Nous avons quelques récoltes de cette espèce, réalisées l'été ou l'automne, sur différents secteurs du littoral (La Palmyre, Ronce les Bains) et à l'intérieur des terres (Saintes, St Porchaire, Bédénac, Mornac), mais elle semble malgré tout peu fréquente. A noter page 3 une variabilité des spores qui peut surprendre...

Biblio : littérature courante - Pilzkompodium E. Ludwig band. 3.



