



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Psathyrella fatua (Fr.) Konrad & Maubl.

Synonyme : *P. pseudocorrugis* ss. auct.

Au sol, sur bord de chemin ou sur mulch, souvent grégaire ou en touffe, généralement automnal. Chapeau 10-50 mm, brun ocre, hygrophane, voile fugace formé de fibrilles marginales vers la marge sur jeunes exemplaires. Lames à arête blanche, souvent brun-rouge (loupe). Stipe pâle. Spores 7-9,5 x 4,5-5,5 µm, cheilocystides et pleurocystides (ces dernières capitées ou sub-capitées) non incrustées.

Voir la fiche de *P. spadiceogrisea* pour les espèces proches.

Psathyrelle probablement assez fréquente, mais à examiner de près pour la distinguer de *P. spadiceogrisea*, taxon connu, et peut-être encore plus de *P. albescens*, bien moins connu, lesquels ne possèdent jamais l'arête surlignée.

Biblio : Fouchier « Le Genre Psathyrella » FAMM 1995 (clés dichotomiques d'après Kits van Waveren) - Pilzk. Band. 2 Erhard Ludwig

Fiche réalisée en septembre 2021 par Patrice TANCHAUD