



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula violeipes Quélet

Nom français : Russule à pied violet

En forêt. Chapeau velouté de couleurs variables, allant de rouge-pourpre, violet carminé à jaune verdâtre. Lames crème à maturité. Stipe lavé de violacé. Saveur douce. Odeur de topinambour ou d'écrevisse en train de cuire. Phénol brun chocolat. Sporée 2a-2b. Spores 7,5-9 x 6,5-8 µm. Poils de la cuticule à article terminal en pointe reposant sur des articles typiquement globuleux (ce qui est peut-être le meilleur caractère selon Romagnesi).

Les récoltes à chapeau jaune citrin sont nommées *R. violeipes f. citrina*, forme souvent placée en synonymie comme nous le faisons ici.

Vu la variabilité des couleurs du chapeau des espèces de cette Ss. Section *Amoenineae*, deux taxons sont parfois délicats à distinguer ; le recours à la réaction au phénol, à la sporée et à l'étude microscopique peuvent s'avérer indispensables, cf. fiche *R. amoenicolor*.

Cette russule est visible chaque automne, parfois dès les mois d'été, plus particulièrement la forme jaune comme dans de nombreuses régions.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.



phénol



