



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula cessans Pearson

Nom français : Russule tardive

Surtout sous pins. Chapeau viscidule à brillant, rougeâtre violacé à brun rouge, marge non cannelée ou tardivement. Lames jaunes à maturité. Stipe fragile, blanc, légèrement jaunissant. Saveur douce. Sporée 4b-4c. Gaïac vif sur stipe et lames. Spores 7-10 x 6,5-8 µm réticulées.

Avec la même saveur et une couleur de sporée plus ou moins similaire, à comparer avec :

- *R. turci* : sous conifères, chapeau cocardé, odeur d'iode à la base du stipe, gaïac nul ou presque sur stipe et lames ;
- *R. suberetorum* : sous chênes verts ou chênes-lièges, chapeau aux couleurs variables (violet, rose-brun, ocre jaune ou verdâtre), odeur fruitée, gaïac plus faible sur stipe et lames, spores densément crêtées à subréticulées, dermatocystides avec nombreuses cloisons ;
- *R. odorata* : sous feuillus (surtout chênes), jaunissante, gaïac vif sur stipe et lames.

Cette russule est très fréquente dans nos secteurs sablonneux, sur le littoral et à l'intérieur des terres. Elle se rencontre généralement durant les mois de novembre et de décembre, parfois jusqu'en février ; elle peut également apparaître, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, dès les mois d'été.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.

