



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita dryophila Consiglio & Contu

Sous chêne (*Quercus sp.*). Chapeau de couleurs ternes, brun noisette, parfois avec des teintes orange, non ou largement et basement mamelonné. Lames blanches. Stipe orné de teintes orangées. Réaction banale au phénol. Spores $10,6-11,9 \times 8,9-10,2 \mu\text{m}$, plus ou moins largement elliptiques.

A comparer avec *A. oblongispora*, qui normalement, ne présente pas de teintes orangées et dont les spores sont plus oblongues.

Cette amanite de la sous-section *Vaginatinae* (amanites sans anneau) semble visible assez régulièrement dans son écologie (sous chênes) lorsque les conditions sont favorables, par exemple sur les communes de Saintes, Les Essards, Plassay ...

Biblio : Galli : Le Amanite

Avec corrections de M. S. Poumarat :

- page 103 (*sub nomen A. beckeri*) : *A. dryophila*. *A. beckeri* possède un voile général brun (de brun noisette à brun-gris), des cannelures piléiques plus longues et a une stature moins puissante (avec un stipe qui pourrait vite, voir la photo page 104 en bas) que *A. dryophila* qui, elle est bien représentée page 104 haut et page 105 haut.
- page 104 haut (*sub nomen A. beckeri*) : *A. dryophila* : voir commentaire juste au-dessus.
- page 105 bas (*sub nomen A. oblongispora*) : *A. dryophila* ?

