



Ordre : *Gomphales*

Famille : *Ramariaceae*

Ramaria roellinii Schild

Dans les prés et les milieux secs, sur sol pauvre. Fructification de petite taille, 4 cm maximum, rameaux ocre crème, ocre jaune à jaune-brun, extrémités plus pâles puis concolores. KOH brun chocolat à brun-pourpre sur chair et noir sur exsiccatum. Spores épineuses 5-8 x 3-4,5 μm , boucles présentes et cristaux étoilés dans les rhizomorphes.

La récolte présentée ici a été réalisée en novembre 2013, dans l'arrière-dune de la Pointe espagnole, commune de La Tremblade. Les exemplaires atteignaient 4 cm au plus. La réaction à la potasse s'est révélée conforme à la littérature. Les spores observées mesuraient 5-8 x 3-4,5 μm . Nous avons pu, tant bien que mal vu la présence de sables dans les rhizomorphes, constater la présence de cristaux.

Vu la rareté et l'écologie inhabituelle de l'espèce, M. Marcel Gannaz a bien voulu étudier notre récolte, et nous le remercions de l'avoir insérée dans l'ouvrage cité ci-dessous.

Biblio : Bull. FMDS 91 (1983) - Die Gattung Ramaria in Deutschland Josef Christan p. 280 - Cahiers FMBDS n° 6 (2017) Gannaz & Raillère-Burat.