



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Clitopilus cf. passeckerianus (Pilát) Sing.

Espèce décrite d'après récoltes sur meules de champignonnières, également signalé depuis dans la nature sur fumier de cheval, paille compostée et meule de foin. Chapeau latéral 0,8-4 cm, blanc. Lames blanches, légèrement rosâtres à maturité. Stipe subnul. Odeur et saveur farineuses. Spores 7-9 x 4-5 µm.

Mis à part l'écologie, nous ne voyons guère comment séparer ce taxon de *C. hobsonii*. Des études sont en cours sur ces clitopiles non stipités, dans l'attente d'informations nouvelles, nous présentons deux récoltes sous le binôme décrit ici :

- ci-dessus à gauche : octobre 2012 sur la commune du Gua, sur vieille bouse de vache, odeur et saveur subfarineuses, spores 7-8(8,5) x 3,5-4,5(5) µm ;
- ci-dessus à droite : décembre 2016 à Soulignonne, sur paille pourrissante, odeur et saveur farineuses, spores 7-8,5 x 4-5 µm.

Biblio : Flore analytique des champignons supérieurs Kühner & Romagnesi p. 174 - Pilzkompodium band 1 - Miscellanea Mycologica n°50 (mars 1997).