



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita huijsmanii Massart & Rouzeau

Sous chêne, normalement thermophile. De petite taille et plutôt grêle. Chapeau jusqu'à 4 cm, un peu mamelonné, gris d'aspect métallisé, parfois nuancé de beige, plus ou moins avec des restes de voiles en lambeaux, marge assez grossièrement cannelée. Stipe souvent assez court pour une amanite (environ le diamètre du chapeau), blanc, finement fibrilleux. Volve mince, courte à longuement vaginée. Spores 12,5-14,5 x 9-10,5 µm, nettement elliptiques.

Cf. fiche *A. argentea*, pour les espèces grises poussant sous feuillus.

Sous conifères, voir la fiche de *A. supravolvata*.

Sous chênes, avec un chapeau beige ochracé voir par exemple *A. dryophila* et *A. lividopallelescens*.

Distinguer ces amanites grises n'est pas une simple affaire, le recours à une microscopie pointue, voire à un séquençage, n'est pas superflu. Cette espèce semble occasionnellement présente dans la région.

Biblio : F. Massart & Rouzeau, 1989, Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux 17(3) :159.

Fiche réalisée en avril 2025 par Patrice TANCHAUD