

Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinellus plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonyme : *Coprinus plagioporus*

Terrestre, sur humus ou brindilles. Chapeau brun rougeâtre, pubescent par la présence de soies. Stipe blanc. Spores 9-14 x 6-7,5 µm. Identifiable seulement au microscope et caractérisé notamment par ses soies piléiques à apex élargi et ses cheilocystides globuleuses.


Nous avons deux récoltes réalisées sur « mulch » (broyat d'écorces) en mai et juin 2009, dans un parc à Saintes. La présence de soies piléiques à sommet légèrement capité, est déjà l'élément essentiel conduisant à cette espèce. Notre détermination semble confortée par la présence de cheilocystides globuleuses, de caulocystides cylindriques, l'absence de pleurocystides et des spores mesurant 11-15 x 6-7 µm à pore germinatif excentré.

Biblio : Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrhard Ludwig, Pilzkompodium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin).

Fiche réalisée en mai 2015 par Patrice TANCHAUD



cutic



caulos

