



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinopsis lagopus (Fr. : Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonyme : *Coprinus lagopus*

Nom français : Coprin pied-de-lièvre

A terre, en forêt, sur les bords de chemins. Chapeau gris à voile pelucheux labile. Stipe blanc, très pelucheux. Spores 10-14 x 6-8 μm . A comparer avec :

- *C. pachyderma* : sur débris de bois pourrissants, plus petit, spores ovoïdes plus larges, voile constitué d'éléments cylindriques à parois épaisses au centre du chapeau ;
- *C. cinerea* et *C. macrocephala*, espèces coprophiles et *C. jonesii* vient sur place à feu.


Espèce très fréquente qu'il est possible de rencontrer à toutes périodes de l'année.

Biblio : Littérature courante - Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrard Ludwig, Pilzkompodium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 288 - Mille et un champignons P. Roux.

Fiche réalisée en juin 2020 par Patrice TANCHAUD




voile





cheilos

pleuro



voile



cheilos