




Barbezières (16), avril 2009



Soulignonne, sept 2009

Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae



Coprinopsis patouillardii (Quél.) G. Moreno






Sur fumier, paille et autres débris. Chapeau globuleux à cylindrique, jusqu'à 20 mm épanoui, couvert d'un voile poudreux brun rosé pâle. Stipe blanc. Spores 6,5-9 x 6-8 μm , arrondies, anguleuses et plus ou moins pentagonales. Il est à comparer avec :

- *C. cordispora* (synonymisé par certains auteurs et où les limites nous paraissent en effet bien ténues) : cheilocystides en partie lagéniformes ;
- *C. cardiaspora* : spores en forme de cœur ou de poire, taxon là aussi délicat et parfois synonymisé dans certains ouvrages, que nous pensons pouvoir séparer au vu de ses spores particulières (cf. notre fiche).

Ce coprin peut apparaître occasionnellement à toutes saisons, nous l'avons observé sur paille et sur fumier dans de nombreux secteurs, également parmi le terreau dans un pot de fleurs.

Biblio : Studies in Coprinus d'Uljé - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - Fungi fimicoli Italici F. Doveri - BK4 296, Pilzlopendium E. Luwig band 2 - Funga nordica.





*Soulignonne,
janv. 2010*